3595. *Cercospora granuliformis* Ellis et Holway Journal of mycology 1885, p. 6.
Sur les feuilles languissantes d'un *Viola*. Madison (Visconsin) Etats réunis de l'Amérique sept. septembre 1885. W. *Trélease*.

3596. *Exosporium depazeoides* Desm. 17° not. Ann. sc. nat. 1849. — Plant cr. Fr. n. 1549.
Sur les feuilles vivantes du *Sambucus nigra* L. octobre 1884. Forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) *Feuilleaubois* (715).

3297. *Sclerotium durum* Pers. Syn. p. 121, f. *Conii maculati*.
Parc du château de Brissac, au grand Quevilly près de Rouen (Seine-Inférieure), été 1884. *Abbé Letendre*.

3598. *Rhizoctonia violacea* Tul. Fung. Hypog. p. 188. — Sacc. Mich. II. p. 490. *v. Meliae*
Sur les racines pourrissantes du Lilas d'Amérique (*Melia Azedarach*) (que le parasite a desséchées) profondément enfoncées dans la terre. A Toulouse dans mon jardin. Juin 1883.
Angèle Roumeguère.

3599. *Erineum Oxyacanthae* Pers. mycol. Europ. p. 7. — Chevall. Fl. Paris 1. p. 31. — Fée Mem. Phyll. n° 68. Icon. T. III, f. 3.
Sur les bords de la face inférieure des feuilles du *Crategus oxyacantha*. Juin 1885. Forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Feuilleaubois (783).

3600. *Erineum Auberti* West. sp. ined. in Herb.
Sur les feuilles du Viburnum Lantana.
Luxembourg (Belgique). Leg. *Aubert*. (*Reliq. Westendorpii*).

Champignons nouveaux ou rares de l'Aube. — Fasc. II
par le Major Briard.

Doassansia Sagittariae (West.) Saccardo — *Uredo Sagittariae* West. n° 1177, Herb. Cryp. Belge ; *Protomyces bizzozerianus*, Saccardo Mich. 1. p. 97. — Fungi italici, fig. 103. — Protomyces Sagittariae Fuck. Symb. p. 75. — Entyloma Bizzozerianum, Sacc. Mich. 2, p. 135. Petites pustules nombreuses, souvent confluentes, hypophylles, brun-jaunâtre, placées sur une tache jaune-pâle, apparente des deux côtés de la feuille, de forme généralement circulaire, s'effaçant graduellement aux bords et brunies au centre par les pustules qui ont environ 1/9, 1 8 mill. de diam. ; spores irrégulièrement globuleuses, à épispore lisse, jaune très pâle ou subhyalines sous le microscope, à intérieur granulé 12-14 diam. ; basides très fines et courtes: filaments rameux, croisés, hyalins, 3 micro. diam. — 20 août 1885. Sur les feuilles vivantes du *Sagittaria sagittaefolia* à Troyes. *(Briard.)*

Obs. Je me suis adressé à M. Roumeguère, qui possède l'herbier de Westendorp, à l'effet de connaître si la plante que je lui envoyais en communication était bien *l'Uredo sagittariae*, classé dans l'herb. cryp. belge sous le n° 1177. Non seulement sa réponse a été affirmative, mais il a en outre eu l'obligeance de m'envoyer la description de Westendorp lui-même, en ajoutant ce qui suit : « C'est, je crois bien, un mauvais *Uredo*, dans le sens des caractères assignés à ce genre. Il n'a pas été cité par les successeurs de Westendorp, si ce n'est par Lambotte, et je crois bien qu'il faudra renvoyer la

production à un autre genre, entre les *Entyloma* et les *Physoderma?* » (1).

M. le professeur Saccardo ayant publié cette plante sous le nom de *Protomyces Bizzozerianus* et *Entyloma Bizzozerianum*, j'ai cru devoir le prier de me donner son avis sur cette production critique et rare. Il m'a répondu que l'examen qu'il avait fait du spécimen que je lui avais adressé, l'avait fort intéressé et qu'il avait pu se convaincre que nous avions affaire à un *Doassansia*, genre récemment créé par M. Cornu ; d'où il conviendrait de lui donner le nom de *D. Sagittariae* (West.). Lettre du 6 nov. 1885.

Ce qui précède était écrit quand j'ai reçu de M. Paul Hariot, préparateur de botanique au muséum d'histoire naturelle de Paris, la communication suivante : « l'Uredo Sagittariae (West.) a été décrit il y a déjà un an sous le nom de *Doassansia Sagittariae* par Fisch, dans un recueil allemand qui a pour titre : *Berichte der Deutschen otan. Gesellschaft. 21* novembre 1884. L'auteur du *Doassansia Sagittariae* serait donc Fisch et non Saccardo. »

Physalospora callunae (de Not.) Saccardo *Sylloge* 1,447. Variété *rubi* Saccardo et Briard. Périthèces épars ou plus ou moins groupés sur des taches blanchâtres non limitées, 1/4, 1/5 de mill. diam. sous-épidermiques, noirs et devenant dresque superficiels en se faisant jour à travers l'épiderme noirci par transparence, globuleux, luisants; thèques cylindracées, subsessiles, à base oblique, octospore, 36-44=10-12; paraphyses filiformes; spores distiques, ovales-elliptiques, obtuses, 2-guttulées, hyalines, 10-12=4-5. — *Hab.* sur les sarments d'un *Rubus*, à Troyes (*Briard.*)

Coccomyces pini (Alb. et Sch.) Karst. Myc. Fenn. I p. 254: Saccardo Mich. I p. 59; V. *affinis*, Sacc. et Briard. Cupule blanc-jaunâtre, sale, érumpente, entourée et recouverte par l'épiderme lacéré; thèques claviformes, arrondies à l'extrémité supérieure, sessiles ou brièvement stipitées, octospores, 120-128=14-16, paraphyses filiformes, guttulées, épaissies et brunies au sommet, paraissant plus longues que les thèques, spores fasciculées, fusiformes-aciculaires courbées ou flexueuses, guttulées ou simples, hyalines, 68-84=4, — *Hab.* sur l'écorce du *Pinus abies* mort et abattu, à Troyes (*Briard*).

Obs. Le 3 septembre dernier, M. le docteur Quélet m'écrivait ce qui suit au sujet de cette production : « Quant au *Phacidium* ou plutôt *Coccomyces*, que je ne vois pas bien, car il me paraît vieux et tout noir, je crois que c'est une variété du *Phacidium pini* par la spore. » En effet, l'épiderme qui la recouvre la rend peu apparente; il faut une grande attention pour l'apercevoir ; mais il suffit de la mettre un moment dans l'eau pour la rendre bien visible et lui donner toute sa fraîcheur.

Chalara rubi. Saccardo et Briard. Hyphes cylindracés, légèrement renflés au milieu, 88-100=8-10, bruns, 3-4 septés; conidies placées à la partie supérieure et dans le prolongement des hyphes, caténulées, cylindriques, hyalines, 4-guttulées, tronquées

(1) M. Winter (*Champignons du Missouri. — Hedwigia.* Octobre 1885). Cite le *Doassansia Sagittariae* Fisch, avec le synonyme *Protomyces Sagittariae* Fuckel et nullement avec les autres synonymes dont il est ici question (*Uredo Sagittariae* West. notamment) La plante de Fuckel et celle de Westendorp seraient-elles différentes? C. R.

aux extrémités, 18-20=5-6. — *Hab.* Sur les sarments morts d'un *Rubus*, à Troyes (*Briard.*)

Heterosporium ornithogali (Kl.), variété *Allii pori*, Saccardo et Briard. Hyphes brun-clair, septés, toruleux, 80-120=8-10; conidies oblongues, très obtuses, presque régulières, 1-3 septées, à épispore épais, légèrement échinulées, brun-grisâtre, intérieur très finement granulé, 28-44=12-16. — *Hab.* Sur les feuilles mortes ou languissantes de l'*Allium porum*, à Troyes (*Briard*).

Scolecotrichum graminis, Fuckel, Symb. page 107, Saccardo Mich. 2, p. 363. *Azosma punctum*, de Lacroix. *Passalora dactylina*, Pass. Hyphes fasciculés, un peu fuligineux, pellucides, simples sinueux, obtus, 45-60=5 formant des séries parallèles sur les nervures de la feuille; conidies oblongues, atténuées de la base au sommet, subclaviformes, légèrement fuligineuses, 1-septées 32-44= 8-10, paraissant operculées à la base. — *Hab.* sur les feuilles mourantes du *Dactylis glomerata*, à Troyes. (*Briard*).

Phoma quercicola, Saccardo et Briard. Périthèces innés, erumpents noirs, luisants, épiphylles, rapprochés, s'ouvrant par un pore et formant, par leur réunion, de petites taches grisâtres, distinctes, de formes diverses et plus ou moins nombreuses; sporules ovales-oblongues, obtuses, continues, hyalines, 4-6=1,5-2. — *Hab.* à la face supérieure des feuilles mortes et tombées du Chêne, à Troyes (*Briard*).

Diplodina grossulariae, Saccardo et Briard. Périthèces épars, sous-épidermiques, noirs, globuleux, luisants, 1/6, 1/5 de mill. diam. cachés par l'épiderme: sporules oblongues-cylindracées, obtuses ou légèrement fusiformes, 1-septées, non contractées, hyalines, 8-10=2-2,5. — *Hab.* sur les tiges mortes du *Ribes Uva-crispa*, à Troyes (*Briard*).

Pestalozzia monochaetoidea, Saccardo, Sylloge. 3 p. 798; variété *affinis* Saccardo et Briard. Périthèces épars, punctiformes ou oblongs, bruns, s'ouvrant par un pore qui leur donne, parfois, l'apparence cupulée; sporules ovales-elleptiques, arrondies généralement, ou atténuées quelquefois à la base, droites ou légèrement courbées, 3-septées, à loge supérieure conique et hyaline, celle de la base plus obtuse et de couleur plus foncée, les intermédiaires olives, pellucides, non contractées, 12-16=6-7; un cil oblique 10=1; baside filiforme 10=1. — *Hab.* sur les sarments morts et coupés du *Vitis vinifera*, à Troyes (*Briard*).

Champignons du Béarn (2e liste), par MM. E. Doassans et N. Patouillard.

La *Revue mycologique* a publié précédemment (année 1883, p. 91 et suivantes) une première série de champignons récoltés dans la vallée d'Ossau et aux environs de Nay; de nouvelles explorations dans cette riche région nous ont permis d'augmenter considérablement notre travail; nous avons été assez heureux pour observer quelques nouveautés pour la science et aussi un bon nombre d'espèces rares telles que *Ag.* (*Mycena*) *roridus* Fr., *flavipes* Q., *Ag.* (*Lepiota*) *hispida* Lasch., *Marasmius angulatus* Bk, *Wynnei* Bk, *torquescens* Q., *Telephora Sowerbeji* Fr., etc, etc. En mettant au jour cette deuxième liste, nous avons pour but de contribuer dans